

- 1p 17 Wat kan een gevolg zijn van een kleiner deel P?
A verminderde coördinatie van bewegingen
B verminderde reflexen in hoofd- en halsgebied
C verminderde zintuiglijke waarneming
- 1p 18 Als er minder bloed naar deel P gaat, zullen er ook minder hormonen en voedingsstoffen naartoe vervoerd worden.
→ Noteer een andere stof die dan ook minder naar deel P vervoerd wordt.

stof:

Verbrande luchtwegen

Soms komen slachtoffers van een felle brand in het ziekenhuis met verbrande luchtwegen. De behandeling hangt af van de schade die is opgetreden in de luchtwegen.
Als de trilhaarcellen zijn weggebrand, wordt het moeilijker om slijm naar de keelholte te verplaatsen. Bij deze mensen wordt dan slijm uit de luchtwegen gezogen. Soms wordt als behandeling de stof heparine ingeademd. Deze stof vermindert de werking van de bloedplaatjes.

- 1p 19 In welke delen van de luchtwegen kunnen de trilhaarcellen verbranden?
A in de bronchiën en in de luchtpijp
B in de longblaasjes en in de bronchiën
C in de longblaasjes en in de luchtpijp
- 1p 20 Wat heeft het gebruik van heparine tot gevolg?
A De bestrijding van infecties is minder.
B Er kan minder zuurstof vervoerd worden.
C Het bloed kan minder goed stollen.